

## حكومة أونتاريو: عبوات فحص سريع للمضادات

في محاولة لتعزيز عودة أكثر أماناً إلى الفصول الدراسية بعد عطلة الشتاء، يَسُرُّ مجلس مدارس منطقة أوتاوا - كارلتون، بالنيابة عن حكومة أونتاريو، أن يتمكن من توفير عبوات فحص منزلي سريع للمضادات لكل طفل يحضر مدرسة مُمولة من القطاع العام في أونتاريو.

تهدف عبوات الفحص السريع للمضادات إلى استخدامها من قبل أي طفل يحضر مدرسة مُمولة من القطاع العام، بغض النظر عن حالة تطعيمه. من المُقرر توزيع عبوات الفحوص السريعة للمضادات على الطلاب الذين يشاركون في التعلم بالحضور الشخصي. لن يتوفر هذا الاختبار للطلاب الذين واصلوا التعلُّم عن بُعد منذ أيلول/سبتمبر 2021.

يُرجى ملاحظة أن مشاركة طفلك في هذا الفحص السريع للمضادات هي مشاركة طوعية. لا تُشترط المشاركة على الطلاب من أجل العودة إلى الفصل الدراسي بعد عطلة الشتاء.

في حين أن تزويد الطلاب بعبوات الفحص السريع للمضادات يشكل أداة هامة لمعالجة انتشار كوفيد-19، فإن التطعيم يظل أكثر أنواع الحماية فعالية ضد الفيروس ومتحوراته. ومن شأن التأكد من تطعيم الأطفال والشباب أن يوفر لهم مستوى قوياً من الحماية وأن يساعد على إبقاء المدارس مفتوحة وآمنة قدر الإمكان.

من المهم أيضاً أن نتذكر أننا جميعاً بحاجة إلى مواصلة استراتيجيات الصحة العامة الرئيسية التي أثبتت فعاليتها في إبقاء هذه الجائحة تحت السيطرة، بما في ذلك التزام المنزل عندما تشعر بالمرض، والخضوع للفحص إذا ظهرت عليك أعراض، وغسل يديك بشكل متكرر، وارتداء غطاء الوجه حسب الاقتضاء.

يُرجى قراءة المعلومات الهامة الواردة أدناه قبل استخدام عبوات الفحص السريع للمضادات.

### متى تُستخدم عبوات الفحص السريع للمضادات (المُوَزَّعة قبل عطلة الشتاء):

- يوصى الطلاب الذين يختارون استخدام عبوات الفحص السريع للمضادات بإجراء الفحص كل 3 - 4 أيام خلال العطلة، في كل يوم اثنين وخميس، ابتداءً من 23 كانون الأول/ديسمبر، حتى يتم استخدام جميع الاختبارات الخمسة.
- تُستخدم عبوات الفحص السريع للمضادات حصراً عندما لا تظهر أعراض على الطفل (أي أنه لا يعاني من أي من أعراض كوفيد-19 ولم يتعرَّض لحالة كوفيد-19 مؤكدة).
- يجب أن يحصل أي شخص لديه أعراض أو تم تحديده على أنه على اتصال وثيق بحالة مصابة على اختبار تفاعل البوليميريز المتسلسل PCR. ينبغي ألا تُستخدم اختبارات الفحص السريع للمضادات للأشخاص الذين يعانون من أعراض أو الأشخاص الذين على اتصال وثيق بالحالات المصابة كبديل لاختبارات تفاعل البوليميريز المتسلسل.

### استخدام عبوات الفحص السريع للمضادات المنزلية

- يمكن إجراء اختبار بي تي إن إكس سريع الاستجابة™ BTNX Rapid Response عن طريق مسح مقدمة فتحة الأنف (تبعاً للنشرة المرفقة بالعبوة، وحسب موافقة وزارة الصحة الكندية) أو عن طريق مسح عمق فتحة الأنف (على النحو الذي أوصت به هيئة الصحة العامة في أونتاريو في هذه الوثيقة، نظراً للحساسية الأعلى مقارنةً بمسح مقدمة فتحة الأنف). يمكن القيام بكل النوعين من جمع العينات باستخدام المسحة الأنفية البلعومية المتوفرة مع العبوة.
- يُرجى اتباع التعليمات المرفقة لهذه الرسالة.
- **ملاحظة هامة:** يُمكن للأهالي أو الأوصياء اختيار إجراء هذا الفحص على الأطفال الذين قد يحتاجون إلى المساعدة (أي الأطفال الأصغر سناً).

### ما عليك فعله بعد خضوعك للاختبار:

- ستعرف نتيجة الاختبار في غضون 15 دقيقة. إذا كانت نتائج الاختبارات التي أجريت حتى الآن سلبية، يمكن لطفلك أن يلتحق بالمدرسة كالمعتاد. حتى لو جاءت نتيجة طفلك سلبية، يتعين عليه أن يستمر في الالتزام بجميع توجيهات الصحة العامة ذات الصلة، مثل التوجيهات بشأن التجمعات والتباعد وارتداء الكمامات.
- تُعتبر النتيجة الإيجابية لاختبار الفحص السريع للمضادات نتيجة إيجابية أولية. يتعين على الطفل الذي يحصل على نتيجة إيجابية في اختبار الفحص السريع للمضادات أن يسعى إلى إجراء اختبار تفاعل البوليميرز المتسلسل PCR للحصول على تأكيد في أقرب وقت ممكن (في غضون 48 ساعة على النحو الأمثل) في [موقع اختبارات محلي](#) أو صيدلية تُجري الاختبار، ويعزل نفسه حتى تُعرف نتيجة اختبار تفاعل البوليميرز المتسلسل المؤكدة.

### موارد إضافية

كيف تختبر نفسك عبر اختبار بي تي إن إكس سريع الاستجابة الخاص بالاختبار السريع للمضادات لكوفيد-19 [الإنجليزية](#)  
[الفرنسية](#) (PDF)

[الفيديوهات: الاختبارات السريعة للمضادات للطلاب الذين لا يعانون من أعراض](#) (متوفر في عدة لغات)